

Лекції 9

Диференціювання функції багатьох змінних (продовження)

Частинні похідні другого порядку¶

Нехай для функції $z = f(x; y)$ визначені частинні похідні $\frac{\partial z}{\partial x}$ і $\frac{\partial z}{\partial y}$, які, в загальному випадку, також є функціями змінних x і y . Отже, від цих функцій можна знову знайти частинні похідні як за змінною x , так і за змінною y . Ці похідні називаються *частинними похідними другого порядку* функції $z = f(x; y)$.¶

Для похідних другого порядку застосовують наступні позначення:¶

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y) \text{ — функція диференціюється послідовно два рази по } x; ¶$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y) \text{ — функція диференціюється послідовно два рази по } y; ¶$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) \text{ — функція диференціюється спочатку по } x, \text{ а результат потім диференціюється по } y; ¶$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y) \text{ — функція диференціюється спочатку по } y, \text{ а результат потім диференціюється по } x. ¶$$

$$\text{Останні дві похідні } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \text{ і } \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \text{ називають } \mathbf{мішаними}. ¶$$

Теорема. Якщо частинні похідні другого порядку неперервні, то мішані похідні рівні між собою за умови їх неперервності:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

Приклад. Знайти частинні похідні другого порядку функції $z = x^4 - 2x^2y^3 + y^5 + 1$
Знайдемо частинні похідні першого порядку:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (x^4 - 2x^2y^3 + y^5 + 1)'_x = 4x^3 - 4xy^3;$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (x^4 - 2x^2y^3 + y^5 + 1)'_y = -6x^2y^2 + 5y^4.$$

Тепер знайдемо частинні похідні другого порядку:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (4x^3 - 4xy^3)'_x = 12x^2 - 4y^3;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (-6x^2y^2 + 5y^4)'_y = -12x^2y + 20y^3;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (4x^3 - 4xy^3)'_y = -12xy^2;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = (-6x^2y^2 + 5y^4)'_x = -12xy^2.$$

Диференціали вищих порядків

Диференціал 2-го порядку функції $z = f(x, y)$ означають формулою

$$d^2z = d(dz).$$

Якщо функція f має неперервні частинні похідні і змінні x та y незалежні, то

$$\begin{aligned} d^2z &= d\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right) = \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right)'_x dx + \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right)'_y dy = \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} dy dx + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2 = \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^2 z. \end{aligned}$$

У разі незалежних змінних x та y для *диференціала m -го порядку* функції z , який означають рівністю

$$d^m z = d(d^{m-1} z),$$

маємо аналогічну формулу:

$$d^m z = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^m z,$$

Похідна за напрямом


Будь-який напрям l у просторі можна задати одиничним вектором

$$\vec{l}^0 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \cos \beta \\ \cos \gamma \end{pmatrix},$$

де α, β, γ — кути, утворені напрямом l з осями Ox, Oy і Oz .

Нехай функція $u = f(x, y, z)$ означена в деякому околі точки M_0 з радіусом вектором

$$\vec{r}_0 = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j} + z_0 \vec{k}.$$



Похідною функції $u = f(x, y, z)$ за даним напрямом \vec{l} в точці M_0

називається границя $\lim_{M \rightarrow M_0} \frac{u(M) - u(M_0)}{M_0M}$, яка позначається $\frac{\partial u}{\partial l}$ або $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{M_0}$.

Тут $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M_0(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$, $M_0M = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$.

Отже, за означенням $\frac{\partial u}{\partial l} = \lim_{M \rightarrow M_0} \frac{u(M) - u(M_0)}{M_0M}$.

Якщо функція $u = f(x, y, z)$ диференційована, то має місце формула

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma,$$

де $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ - напрямні косинуси вектора \vec{l} .

Похідна за напрямом характеризує швидкість зміни функції за даним напрямом.

Приклад. Знайти похідну функції $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ у точці $M(1;2;1)$ за напрямом вектора $\vec{l} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$.

Розв'язування прикладу

1. Похідна функції $u = f(x, y, z)$ за напрямом $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ обчислюється за формулою

$$\frac{\partial u}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma.$$

2. Знайдемо частинні похідні заданої функції $u(x, y, z)$ у точці $M(1;2;1)$.

Вважаючи y і z сталими, знаходимо:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\ln(x^2 + y^2 + z^2))'_x = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M = \frac{2}{1+4+1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Вважаючи x і z сталими, знаходимо:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\ln(x^2 + y^2 + z^2))'_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Вважаючи x і y сталими, знаходимо:

$$\frac{\partial u}{\partial z} = (\ln(x^2 + y^2 + z^2))'_z = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_M = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

3. Знайдемо напрямні косинуси вектора $\vec{l} = (2;4;4)$.

$$|\vec{l}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = 6; \quad \cos \alpha = \frac{l_x}{|\vec{l}|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}; \quad \cos \beta = \frac{l_y}{|\vec{l}|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}; \quad \cos \gamma = \frac{l_z}{|\vec{l}|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

4. Знайдемо шукану похідну.

За формулою $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{l}} \right|_M = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M \cdot \cos \alpha + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M \cdot \cos \beta + \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_M \cdot \cos \gamma$ знаходимо

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{l}} \right|_M = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{9}.$$

Гradient функції.

Означення. Gradientом функції $u = f(x, y, z)$ називається вектор, проекціями якого на координатні осі відповідні частинні похідні даної функції:

$$\text{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}.$$

Gradient вказує напрямок найшвидшого зростання функції в даній точці. Похідна у напрямі gradientа має найбільше значення, тобто у напрямі $\vec{l} = \text{gradu}$:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial l} \right)_{\max} = |\text{gradu}| = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2}.$$

Приклад. Знайти gradient функції $u = x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz$ у точці $M_0(1; -1; 2)$.

Розв'язування прикладу

1. Згідно з означенням gradient функції $u(x; y; z)$ у точці M_0 є вектор:

$$\text{gradu}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{M_0} \cdot \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{M_0} \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{M_0} \cdot \vec{k}.$$

2. Обчислимо частинні похідні заданої функції в точці M_0 .

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2yz; \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{M_0} = 2 + 4 = 6;$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2y - 2xz; \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{M_0} = -2 - 4 = -6;$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2z - 2xy; \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{M_0} = 4 + 2 = 6.$$

3. Знайдемо gradient заданої функції.

$$\text{grad } u(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{M_0} \cdot \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{M_0} \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{M_0} \cdot \vec{k} = 6\vec{i} - 6\vec{j} + 6\vec{k}.$$

Відповідь: $\text{gradu}(M_0) = 6\vec{i} - 6\vec{j} + 6\vec{k}$