

Методи інтегрування

Метод безпосереднього інтегрування.

Цей метод ґрунтується на розкладі підінтегральної функції в лінійну комбінацію більш простих функцій та на застосуванні властивостей невизначеного інтеграла.

Приклад . Обчислити інтеграл: $\int \left(5 \cos x - 9x^2 + \frac{7}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$

Розв'язання.

Застосовуючи властивість лінійності невизначеного інтеграла, маємо

$$\begin{aligned} \int \left(5 \cos x - 9x^2 + \frac{7}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx &= 5 \int \cos x dx - 9 \int x^2 dx + 7 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= 5 \sin x - 3x^3 + 7 \arcsin x \end{aligned}$$

Приклад . Обчислити інтеграл: $\int \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx$.

Розв'язання.

$$\begin{aligned} \int \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)^2 dx &= \int \left(\sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right) dx = \\ &= \int (1 + \sin x) dx = \int dx + \int \sin x dx = x - \cos x + C. \end{aligned}$$

Приклад . Обчислити інтеграл

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{x^2+4} dx &= \int \frac{(x^2+4)-4}{x^2+4} dx = \int \left(1 - \frac{4}{x^2+4} \right) dx = \int dx - 4 \int \frac{1}{x^2+4} dx = \\ &= x - 4 \cdot \frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} + C = x - 2 \arctg \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

Метод підведення під знак диференціала

Диференціал функції $y = f(x)$ дорівнює $dy = y'dx$. Цю формулу можна застосовувати і в зворотньому порядку:

$$3x^2 dx = d(x^3)$$

$$\cos x dx = d(\sin x) \qquad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = d(\arcsin x)$$

Тому часто для приведення інтегралу до табличного застосовують формулу:

$$f'(u) du = d(f(u)).$$

Припустимо, що в інтегралі $\int f(x)dx = F(x) + C$ від підінтегральної функції $f(x)$ можна відокремити функцію $\varphi(x) = u$ таку, що підінтегральний вираз запишеться у вигляді

$$f(x)dx = g(\varphi(x))\varphi'(x)dx = g(u)du.$$

Тоді за теоремою маємо

$$\int f(x)dx = \int g(u)du$$

Приклад. $\int \sin^3 x \cdot \cos x dx = \int \sin^3 x \cdot d(\sin x) = \frac{\sin^4 x}{4} + c$

Приклад. $\int \arcsin^9 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \arcsin^9 x d(\arcsin x) = \frac{\arcsin^{10} x}{10} + c$

При операції підведення під знак диференціала часто використовують такі перетворення диференціала:

$$\begin{array}{lll}
 dx = d(x + a); & dx = \frac{1}{a}d(ax); & dx = \frac{1}{a}d(ax + b); \\
 \frac{dx}{x} = d(\ln x); & \frac{dx}{x+a} = d(\ln(x+a)); & x^n dx = \frac{1}{n+1}d(x^{n+1} + a); \\
 \cos x dx = d(\sin x); & \sin x dx = -d(\cos x); & \frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x); \\
 \frac{dx}{\sin^2 x} = -d(\operatorname{ctg} x); & \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = d(\arcsin x); & \frac{dx}{1+x^2} = d(\operatorname{arctg} x).
 \end{array}$$

Приклад.

$$1) \int \operatorname{ctg} x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \ln|\sin x| + c$$

Приклад.

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-d(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + c;$$

$$\int \frac{dx}{x+8} = \int \frac{d(x+8)}{x+8} = \ln|x+8| + c$$

$$\int \cos(3x+2) dx = \int \cos(3x+2) \cdot \frac{1}{3} d(3x+2) = \frac{1}{3} \sin(3x+2) + c$$

Метод заміни змінної інтегрування

В багатьох випадках введення нової змінної інтегрування дозволяє звести знаходження шуканого інтеграла до табличного. Існують два варіанта цього методу.

Приклад . Знайти $\int \sqrt{3x+4} dx$.

Розв'язок. Позначимо $t = 3x + 4$. Тоді $dt = (3x + 4)' dx = 3dx$ и $dx = \frac{1}{3} dt$.

$$\int \sqrt{3x+4} dx = \int \sqrt{t} \cdot \frac{1}{3} \cdot dt = \frac{1}{3} \int t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{9} \sqrt{(3x+4)^3} + C. \bullet$$

Приклад . Знайти $\int e^{\sin x} \cos x dx$.

Розв'язок. Позначимо $t = \sin x$. Тоді $dt = (\sin x)' dx = \cos x dx$.

$$\int e^{\sin x} \cos x dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{\sin x} + C. \bullet$$

Метод інтегрування частинами

Нехай u и v – дві функції незалежної змінної x , що диференційовані на $[a, b]$

Оскільки $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, то функція $u \cdot v$ – первісна для суми $u'v + uv'$. Тоді

маємо

$$\int (u'v + uv') dx = uv + C.$$

$$\int vu' dx + \int uv' dx = uv + C$$

Враховуючи, що $u' dx = du$, $v' dx = dv$, будемо мати

$$\int v du + \int u dv = uv + C.$$

Отже,

$$\int u dv = uv - \int v du + C.$$

Оскільки $\int vdu$ включає довільну сталу, то до неї можна включити і сталу C .

Остаточно отримаємо вираз:

$$\int u dv = uv - \int v du ,$$

що називають **формулою інтегрування частинами**.

За допомогою цієї формули знаходження інтеграла $\int u dv$ зводиться к пошуку іншого інтеграла $\int v du$, який буде або табличним, або подібним початковому, або інтеграла, що знаходиться за допомогою заміни змінної. При цьому за u береться така функція, яка при диференціюванні спрощується, а за dv – та частина підінтегрального виразу, інтеграл від якої відомий або може бути знайдено.

Вкажемо деякі типи інтегралів, які зручно обчислювати методом інтегрування частинами.

1. Інтеграли вигляду $\int P(x)e^{\alpha x} dx$, $\int P(x)\sin \alpha x dx$, $\int P(x)\cos \alpha x dx$, де $P(x)$ – многочлен, α - число. За u слід прийняти $P(x)$, а за dv – відповідний вираз $e^{\alpha x} dx$, $\sin \alpha x dx$, $\cos \alpha x dx$.
2. Інтеграли вигляду $\int P(x)\ln x dx$, $\int P(x)\arcsin x dx$, $\int P(x)\arccos x dx$, $\int P(x)\arctg x dx$, $\int P(x)\text{arcctg} x dx$. За u приймають відповідно функції $\ln x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, а за dv – вираз $P(x)dx$.
3. Інтеграли вигляду, $\int e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x dx$, $\int e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x dx$, де α и β - числа. Не має різниці, що прийняти за u : $e^{\alpha x} dx$, або $\sin \beta x$.

Зауваження. Інтегрування частинами може застосовуватися декілька разів.

Приклад . Знайти $\int x \cos x dx$

$$\text{Розв'язок. } \int x \cos x dx = \left\| \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \cos x dx \\ v = \int \cos x dx = \sin x \end{array} \right\| = x \cdot \sin x - \int \sin x dx = x \cdot \sin x + \cos x + C.$$

Приклад . Знайти $\int (4x + 2) \cos 5x dx$

Розв'язок.

$$\int (4x + 2) \cos 5x dx = \left\| \begin{array}{l} u = 4x + 2 \\ du = 4 dx \\ dv = \cos 5x dx \\ v = \int \cos 5x dx = \frac{1}{5} \sin 5x \end{array} \right\| = (4x + 2) \cdot \frac{1}{5} \sin 5x - \int \frac{1}{5} \sin 5x \cdot 4 dx =$$
$$= \frac{4x + 2}{5} \sin 5x + \frac{4}{25} \cos 5x + C$$

Приклад . Знайти $\int \ln x dx$.

Розв'язок. Позначимо $u = \ln x$, $dv = dx$. Тоді $du = \frac{dx}{x}$, $v = x$. Застосувавши

формулу інтегрування частинами, знаходимо:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{dx}{x} = x \ln x - x + C.$$

Приклад . Знайти $\int \sin x \cdot e^x dx$.

$$\begin{aligned} \text{Розв'язок. } I &= \int \sin x \cdot e^x dx = \int \sin x de^x = \sin x \cdot e^x - \int e^x d(\sin x) = \\ &= e^x \sin x - \int \cos x \cdot e^x dx = e^x \sin x - \int \cos x de^x = e^x \sin x - e^x \cos x + \int e^x d(\cos x) = \\ &= e^x \sin x - e^x \cos x - \int \sin x \cdot e^x dx = e^x (\sin x - \cos x) - I. \end{aligned}$$

$$\text{Тоді } 2I = e^x (\sin x - \cos x) \quad \text{або} \quad I = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$